



Patiëntenvoorlichting

Glucose-ademtest

1. Doel (van het onderzoek)

Met deze test wordt bacteriële overgroei in de dunne darm opgespoord. Een teveel aan bacteriën in de dunne darm leidt tot de vorming van o.a. waterstofgas en/of methaangas wat verteringsproblemen met buiklast, krampen of diarree kan veroorzaken. Deze klachten kunnen ook optreden tijdens of na het onderzoek, maar verdwijnen in de loop van de dag. Als de klachten niet verdwijnen, is het raadzaam om uw behandelde arts te contacteren.

2. Voorbereiding van het onderzoek

- ✓ Vanaf vier weken voor de test geen antibiotica innemen.
- ✓ Vanaf drie dagen voor de test geen laxeremiddelen innemen.
- ✓ De dag voor de test geen koolhydraatrijke voedingsmiddelen (uien, kolen, bonen, schorseneren, aardpeer,...) eten
- ✓ Als u diabetes hebt, raadpleegt u best op voorhand uw arts.

3. Het onderzoek

- ✓ U moet op regelmatige tijdstippen blazen in een ademtestapparaat genaamd: Lactofan2
- ✓ We starten met éénmalig nuchter in het toestel te blazen. Daarna drinkt u een glucoseoplossing.
- ✓ U blaast verder om de 30 minuten gedurende een periode van 2.5 uur.
- ✓ Meer details over het verloop worden ter plaatse uitgelegd en getoond.

4. Nazorg

- ✓ Geen.
- ✓ U mag na de test het ziekenhuis verlaten en uw normaal voedingsregime volgen.

5. Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Einde document

Versiedatum: 08/03/2018