



## Patiëntenvoorlichting

# Ureumademtest

### 1. Doel (van het onderzoek)

Met deze test onderzoeken we de aanwezigheid van de bacterie *Helicobacter pylori* in de maag. U moet een gemerkt ureumtabletje innemen samen met een brikje fruitsap. Als de bacterie in de maag aanwezig is, worden deze afgebroken tot koolzuurgas dat iets verschilt van het natuurlijke uitgedemde gas.

### 2. Voorbereiding van het onderzoek

- ✓ Vanaf vier weken voor de test geen antibiotica innemen.
- ✓ Ook medicatie voor de maag (zuurremmers) met u minstens 1 week voor het onderzoek stoppen.
- ✓ Als u diabetes hebt, raadpleegt u best op voorhand uw arts.

### 3. Het onderzoek

- ✓ U moet blazen in 2 zakjes
- ✓ We starten met een nuchtere staalname (zakje 1). Daarna moet u een fruitsapje drinken in combinatie met het ureumtabletje. U blaast na 30 min in het tweede zakje.
- ✓ Meer details over het verloop worden ter plaatse uitgelegd en getoond.

### 4. Nazorg

- ✓ Geen.
- ✓ U mag na de test het ziekenhuis verlaten en uw normaal voedingsregime volgen.

### 5. Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Einde document

Versiedatum: 08/03/2018