

Pijn op de plaats van de injectie

Wanneer u tijdens de toediening van de chemotherapie pijn krijgt ter hoogte van de injectieplaats, waarschuwt u onmiddellijk de verpleegkundige.

Zij gaat na of de infuuskatheter nog goed zit en de medicatie in de ader loopt. Als dit niet meer het geval is, wordt de katheter verwijderd en de ader opnieuw aangeprikt.

Na de toediening van de chemotherapie kunt u een lichte verkleuring van de huid (wit, rood, bruin) opmerken ter hoogte van de injectieplaats of verder langs de ader. Dit kan pijnlijk zijn.

Algemeen advies

Kijk naar de injectieplaats van de katheter. Wanneer de huid verkleurd is of pijnlijk aanvoelt, gebruik dan nooit op eigen initiatief een verband of zalf. Raadpleeg uw arts of verpleegkundige.

Raadpleeg uw arts of verpleegkundige

- Als u pijn hebt en als er een zwelling optreedt op de injectieplaats.
- Als de huid op de injectieplaats verkleurt en pijnlijk aanvoelt.
- Als de verkleuring van de huid snel toeneemt.
- Als u pijn hebt op de injectieplaats tijdens het inlopen: dit moet u altijd meteen melden.

Om deze nevenwerking te voorkomen, wordt bij patiënten die chemotherapie krijgen doorgaans een poortkatheter geplaatst.