

Proteïnurie en hypertensie

Deze nevenwerking kan optreden bij bepaalde chemotherapies. Meestal gaat dit niet gepaard met klachten. De huisarts kan het best uw bloeddruk opvolgen en zo nodig behandelen in de thuissituatie.

Indien u al een hoge bloeddruk hebt voor het starten van de therapie, is dit op zich geen reden de therapie niet te starten, op voorwaarde dat de verhoogde bloeddruk onder controle is.

Patiënten met een verhoogde bloeddruk hebben een grotere kans op ontwikkelen van "proteïnurie". Proteïnurie is een te grote uitscheiding van de hoeveelheid eiwitten via de urine. Op zich geeft dit geen klachten, tenzij vochttopstapeling in extreme gevallen.

Deze proteïnurie zal routinematig worden opgespoord via onderzoek van de urine wanneer u voor uw therapie op het dagziekenhuis komt.

Aanbevelingen

- Op de dagkliniek zal uw bloeddruk worden gemeten. Idealiter wordt uw bloeddruk ook gemeten door uw huisarts of met behulp van een bloeddrukmeter thuis. Belangrijk is dat u de opgemeten waarden steeds meebrengt naar het ziekenhuis, zodat uw arts die kan opvolgen.
- Bij opname op de dagkliniek wordt telkens een onderzoek van de urine uitgevoerd.

Medicatie

- Wanneer de bloeddruk onvoldoende onder controle is, zal de huisarts of de specialist een middel tegen verhoogde bloeddruk starten of toevoegen.
- Als, ondanks de aanpassing van medicatie, de bloeddruk onvoldoende onder controle blijft, zal de therapie met bevacizumab onderbroken worden.
- Wanneer te veel eiwitten in de urine uitgescheiden worden, zal de therapie met bevacizumab onderbroken worden.