




Manometrie

High resolution slokdarmmanometrie



Wat wordt onderzocht?

Onderzoek van slokdarm en de sluitspier op de overgang met de maag.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek wordt gebruikt om slikstoornissen op te sporen en levert nuttige informatie bij onverklaarbare pijnklachten op de borst. Het onderzoek wordt ook aanbevolen bij patiënten die een anti-reflux operatie overwegen.

Vorbereiden

U dient voor dit onderzoek nuchter te blijven. U mag 6 uur vóór het onderzoek niet meer eten. Tanden poetsen mag. Losse tandprotheses dienen verwijderd te worden vlak voor het onderzoek.

Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte van:

- medicatie die u inneemt of tot voor kort innam (zeker bloedverdunners)
- allergie (latex, Xylocaïne ®)
- ademhalingsproblemen
- hartproblemen
- suikerziekte
- zwangerschap

Verloop

- Het onderzoek start in zittende positie
- Nadien wordt een dunne sonde via de neus voorzichtig in de slokdarm gebracht
- U kunt steeds blijven ademen door mond en neus
- Er wordt u gevraagd tijdens de meting 10 slokjes water door te slikken
- Het onderzoek duurt 20 minuten
- Na het onderzoek mag u meteen naar huis en mag u terug eten en drinken
- De gastro-enteroloog zal de metingen beoordelen. U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw behandelende arts



Complicaties

Een slokdarmmanometrie is een routineonderzoek en zeer veilig. Hooguit kan zich wat irritatie voordoen ter hoogte van neus en keel.

Disclaimer

Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is eigenaar van de kennisdocumenten die intern gepubliceerd worden. Het is niet toegelaten deze informatie zonder toestemming van directie / zorgzonenmanager / leidinggevende te verspreiden buiten het ziekenhuis.

Einde document