

Alcoholische hepatitis



Bij langdurig overmatig alcoholgebruik treedt leververvetting (leversteatose) op. Door het alcoholgebruik raakt de vetstofwisseling verstoord in de lever, waardoor vet zich ophoopt in de levercellen (vetstapeling). Leververvetting is omkeerbaar als de oorzaak wordt weggenomen. De lever herstelt zich dus als het alcoholgebruik wordt gestopt.

Bij langdurig alcoholgebruik kan leververvetting overgaan in een ontsteking van de lever. We spreken dan **van alcoholische hepatitis**.

Alcoholische hepatitis kan net als andere leverziekten progressieve [leverfibrose](#) veroorzaken die uitmondt in [levercirrose \(zie hoofdstuk « levercirrose »\)](#). Bij levercirrose kan levertransplantatie nodig zijn. Bij alcoholisch leverlijden wordt die alleen uitgevoerd bij patiënten die minstens 6 maanden volledig alcoholvrij zijn en bij wie een psychologische evaluatie uitwijst dat het risico op herval miniem is. Ook na de levertransplantatie moet de patiënt immers volledig alcoholvrij blijven. Bij levercirrose door alcoholgebruik neemt ook het risico op primaire leverkanker (of hepatocellulair carcinoom) sterk toe.

Fors alcoholmisbruik kan de zogenoemde acute alcoholische hepatitis veroorzaken. Patiënten ontwikkelen dan een acute geelzucht en worden in korte tijd ernstig ziek.

Om leverproblemen door alcoholgebruik te voorkomen wordt geadviseerd om niet meer dan 10 standaardglazen alcohol per week te gebruiken.

Disclaimer

Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is eigenaar van de kennisdocumenten die intern gepubliceerd worden. Het is niet toegelaten deze informatie zonder toestemming van directie / zorgzamenmanager / leidinggevende te verspreiden buiten het ziekenhuis.