



# Complicatie levercirrose:

## Slokdarm- en maagvarices



Er kunnen zich bij levercirrose varices (spataders) in de slokdarm en de maag ontwikkelen.

Als gevolg van de portale hypertensie zoekt het bloed alternatieve wegen om de lever te omzeilen. Dat gebeurt via kleine bloedvaten, die daar eigenlijk niet voor geschikt zijn. Daardoor ontstaan er varices of spataders in de slokdarm- en maagwand.

Een endoscopisch onderzoek (gastroscopie) kan die varices aan het licht brengen. Grote slokdarm- en maagvarices kunnen ernstige bloedingen veroorzaken die endoscopisch worden behandeld. Soms moet daarvoor ook dringend een TIPS worden geplaatst. Om varicesbloedingen te voorkomen worden soms bètablokkers voorgeschreven, zoals propranolol (Inderal) of carvedilol (Kredex). De varices kunnen ook preventief afgebonden worden tijdens een gastroscopie.

### Disclaimer

Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is eigenaar van de kennisdocumenten die intern gepubliceerd worden. Het is niet toegelaten deze informatie zonder toestemming van directie / zorgzonermanager / leidinggevende te verspreiden buiten het ziekenhuis.